

Appendix

Rehabstöd - Risk och Råd

Stöd för rätt sjukskrivning (SRS)

Observera! Kolumnen är endast synlig för de användare som är anslutna till SRS.

I Rehabstöd kan du använda bedömningsstödet för att hantera och prioritera de sjukskrivna patienterna på din enhet. Genom att klicka på sidan "Visa pågående sjukfall" får du fram en lista över de sjukfall som finns på din enhet just nu. Här finns en rubrik som heter Risk, och det är här SRS bedömningsstöd blir tydligt i Rehabstöd. I de fall läkaren har valt att göra en riskberäkning vid intygsskapandet i Webcert, kan du se resultatet i den här vyn.

Rehabstöd
EN TJÄNST FRÅN INERA

Om Rehabstöd Annika Larsson Alfa-enheten

Översikt **Pågående sjukfall** Läkartitlåtanden

1 Driftmeddelande VISA MEDDELANDE

Alla pågående sjukfall
Alfa-enheten

^ **DU LJ SÖKFILTER**

Diagnos Läkare Fritextsökning

Åldersspann Sjukskrivningslängd REKO-status

Ärendestatus Syssetsättning Slutdatum

ÅTERSTÄLL SÖK

Visa personuppgifter Anpassa tabeller SKRIV UT

Visar: 5 av 5 | 5 dagar mellan intyg | Sjukfall visas i 0 dagar efter slutdatum | [ANDRA](#)

Syssetsättning %	Startdatum ↑	Slutdatum %	Längd %	Intyg %	Grad %	Ärenden %	Risk %	Läkare %
Arbetsökande, Nuvarande arbete	2023-06-26	2023-09-23	90 dagar	1	100%	-	●●●	Jönny Tóth GergöPP Anderssån Svenssån
Arbetsökande	2023-05-26	2023-09-02	100 dagar	1	100%	-	●●●	Jönny Tóth GergöPP Anderssån Svenssån

Störst nytta av SRS bedömningsstöd får enheten om alla läkarna använder SRS bedömningsstöd och gör riskberäkning när en sjukskrivning påbörjas. Det bidrar till att så tidigt som möjligt identifiera patienter med hög risk för lång sjukskrivning.

Riskberäkningen visas i Rehabstöd som tre prickar. Dessa prickar visar hur hög risken är för att patientens sjukskrivning blir längre än 90 dagar.

- En gul prick betyder att patienten har måttlig risk för lång sjukskrivning
- Två orangea prickar betyder att patienten har hög risk lång sjukskrivning
- Tre röda prickar betyder att patienten har mycket hög risk för lång sjukskrivning

Om ingen riskberäkning gjorts, men diagnosen finns i bedömningsstödet visas detta som ett streck i riskkolumnen. Vill du läsa mer om hur riskberäkningarna fungerar finns information om det på rattsjukskrivning.se

Personnummer	Namn	Diagnos/er	Startdatum	Slutdatum	Längd	Intyg	Grad	Risk	Läkare
19411029-9221	Alexa React Valfridsson	F432 Anpassningsstörning	2023-06-26	2023-09-23	90 dagar	1	100%	○○○	Jönny Tö GergöPF Anders Svenssä
19380413-9149	Eva-Lisa Britta Svensson	M546 Smärtor i bröstryggen	2023-05-26	2023-09-02	100 dagar	1	100%	○○○	Jönny Tö GergöPF Anders Svenssä
19950119-2380	Gudrun Gullan Göransson	M53 Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras på annan plats	2023-05-26	2023-08-17	84 dagar	1	100%	●●●	Jönny Tö GergöPF Anders Svenssä
19571109-2642	Amanda Petronella Tigransson	B003 Meningit orsakad av herpes simplex-virus (G02.0)	2023-05-23	2023-08-23	93 dagar	1	100%	—	Valborg Larsson
19121212-1212	Tolvan TPU Tolvanon	M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats	2023-04-13	2023-10-27	198 dagar	4	25%	—	Arnold Johansson

I den här vyn kan du välja att sortera listan av sjukskrivna patienter utifrån deras risknivå. På så sätt kan du snabbt få en överblick över vilka patienter som är viktiga att ha lite extra koll på, och säkerställa att rätt åtgärder sätts in i rätt tid och genomförs.

När du klickar på patienten i listan visas sjukfallet med de intyg som ingår. Klicka på Visa intyg på det intyg där riskberäkningen är gjord så öppnas en kopia på sjukintyget. Upp till höger finns en flik där det står Risk och Råd. Under denna flik hittar du SRS bedömningsstöd. Överst ser du råd till dig som rehabkoordinator, som syftar till att påminna dig om viktiga faktorer att för just dig att tänka på.

Du ser också riskberäkningen och läkarens egen bedömning av den beräknade risken. Riskberäkningen följer inte med intyget till Försäkringskassan, utan finns endast i Webcert och Rehabstöd. I det fall läkaren inte har valt att göra en riskberäkning vid intygsskrivandet, visas endast den genomsnittliga risken för sjukskrivning längre än 90 dagar för aktuell diagnos. I det här fallet har läkaren gjort en riskberäkning i Webcert, och därför kan du se att den aktuella risken för den här patienten är hög. Du ser dessutom att läkaren har bedömt riskberäkningen som korrekt.

Martin Österlund 19480403-2094 72 år Man Stäng patientvy

Sjukfall 2020-08-12

Läkarintyg för sjukpenning

Smittbärarpenning

Avstängning enligt smittskyddslagen på grund av smitta. (Fortsätt till frågorna "Diagnos" och "Nedsättning av arbetsförmåga".)

Ej angivet

Grund för medicinskt underlag

Intyget är baserat på min undersökning av patienten

2020-08-12

min telefonkontakt med patienten

Ej angivet

Journaluppgifter från den

Ej angivet

annat

Ej angivet

Obesvarade kompletteringar Risk och råd

Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

- Säkerställa att sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete finns. [visa mer](#)
- Följa upp om rekommenderade/insatta åtgärder har startat. Fungerar de? [visa mer](#)

[Se fler](#)

Risken gäller M54 Ryggvärk

Som läkare, tänk på att

M54 - Ryggvärk

- Förebyggande sjukpenning för behandling kan vara ett [visa mer](#)

Längre ner kan du se vilka råd och åtgärder som bedömningsstödet rekommenderar för den aktuella diagnosen. Under Tänk på att finns råd om faktorer som kan påverka patienten och är viktiga för den aktuella diagnosen och som kan tas upp i dialogen med patienten. Under åtgärdsrekommendationer finns konkreta förslag på åtgärder som läkaren kan välja att kopiera och klistra in i intyget.

Martin Österlund 19480403-2094 72 år Man Stäng patientvy

Sjukfall 2020-08-12

Läkarintyg för sjukpenning

Smittbärarpenning

Avstängning enligt smittskyddslagen på grund av smitta. (Fortsätt till frågorna "Diagnos" och "Nedsättning av arbetsförmåga".)

Ej angivet

Grund för medicinskt underlag

Intyget är baserat på min undersökning av patienten

2020-08-12

min telefonkontakt med patienten

Ej angivet

Journaluppgifter från den

Ej angivet

annat

Ej angivet

Obesvarade kompletteringar Risk och råd

Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

Som läkare, tänk på att

M54 - Ryggvärk

- Förebyggande sjukpenning för behandling kan vara ett lämpligt alternativ till sjukskrivning [visa mer](#)
- Diskutera bakomliggande faktorer och utreda samsjuklighet med psykisk ohälsa [visa mer](#)
- Utreda hur smärtan och rörelseinskränkningen begränsar patientens förmåga att klara sina arbetsuppgifter [visa mer](#)
- Uppmuntra till fortsatt arbete och lagom belastning då det i allmänhet inte är farligt att arbeta trots att det gör ont [visa mer](#)

Åtgärdsrekommendationer

M54 - Ryggvärk

- Ergonomisk arbetsplatsbedömning, via arbetsgivare och företagshälsövård [visa mer](#)
- Arbetsanpassning, via arbetsgivare och ev. företagshälsövård [visa mer](#)
- Individuellt träningsprogram, rådgivning och vid behov smärtbehandling, via fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor [visa mer](#)

* FaR. Fysisk aktivitet nå recitat via FaR-förskrivare (all) [visa mer](#)

I Webcert är de råd och åtgärdsrekommendationer som visas kortfattade och för ett flertal diagnoser finns fler råd och åtgärdsrekommendationer än de som visas. Genom att klicka på "Mer information – Information om den valda diagnosen" kommer du till webbplatsen rattsjukskrivning.se och får där tillgång till den kompletta texten och uppsättningen råd och åtgärdsrekommendationer. Där finns även nationell statistik för den givna diagnosen som visar andelen patienter som har avslutat sina sjukskrivningar vid 30, 90, 180 och 365 dagar. Webbsidan öppnas i ett nytt fönster, och du har hela tiden kvar intyget i Rehabstöd.

Förlängning av sjukskrivning

Bedömningsstödet kan även användas vid förlängning av sjukskrivning. Läkaren kan då göra en ny riskberäkning vid behov om patientens situation och/eller diagnos har förändrats, eller *göra* en riskberäkning om detta inte gjorts vid första sjukskrivningstillfället. Under pågående sjukfall visas alltid den *senaste* beräknade risken i riskkolumnen.

Vid förlängning får läkaren också ta del av nya råd som är viktiga att tänka på vid en förlängning av sjukskrivning. Klickar du in på ett sjukfall där två riskberäkningar har gjorts, väljer du det senaste intyget med riskberäkning för att se aktuell information och anledningen till att en ny riskberäkning gjorts.

Rehabstöd
EN TJÄNST FRÅN INERA

Om Rehabstöd | Annika Larsson
Alfa-enheten

Översikt **Pågående sjukfall** Läkartutåtanden

Gudrun Gullan Göransson, 19950119-2380, 28 år, kvinna | Uppskattad dag i sjukfallet: 56 dagar **STÄNG PATIENTVY**

Driftmeddelande **VISA MEDDELANDE**

Sjukfall Läkartutåtanden

Patientens sjukfall Alfa-enheten

REKO-status: Uppföljning | Anpassa tabeller: Visar 9 kolumner

Intyg till arbetsgivaren

Intyg till arbetsgivaren för patienten - räknas inte in i patientens uppskattade dag i sjukfallet.

Pågående sjukfall

M53 Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras på annan plats - sjukfallets längd 84 dagar

#	Diagnos/er	Startdatum	Stutdatum	Längd	Läkare	Vårdenhet	Vårdgivare	Risk	Intyg
1	M53 Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras på annan plats	2023-05-26	2023-08-17	84	Jönny Tóth GergöPP Anderssån Svenssån	Alfa-enheten	nmt_vg3	●●●	VISA

Martin Österlund 19480403-2094 72 år Man **Stäng patientvy**

Sjukfall 2020-08-12

Läkarintyg för sjukpenning

Smittbärarpenning

Avstängning enligt smittskyddslagen på grund av smitta. (Fortsätt till frågorna "Diagnos" och "Nedsättning av arbetsförmåga".)

Ej angivet

Grund för medicinskt underlag

Intyget är baserat på min undersökning av patienten 2020-08-12

min telefonkontakt med patienten
Ej angivet

journaluppgifter från den
Ej angivet

annat
Ej angivet

Obsvarade kompletteringar **Risk och råd**

Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

Tänk på att vid förlängning

- Följa upp och utvärdera pågående åtgärder. [visa mer](#)
- Alltid överväga om deltidssjukskrivning är ett alternativ till heltidssjukskrivning. [visa mer](#)
- Tidigt kontakta arbetsgivaren om du tror att anpassningar kan bidra till att patienten trots sina besvär kan arbeta. [visa mer](#)
- Om möjligt planera successiv nedtrappning i ett och samma läkarintyg. [visa mer](#)

Om läkaren byter diagnos vid förlängning av sjukintyget så visas råd, åtgärdsrekommendationer och statistik som stödjer den nya diagnosen.

Om sjukskrivningen är längre än 60 dagar går det inte att göra någon riskberäkning. Det beror på att de prediktiva modellerna tagits fram för att så tidigt som möjligt identifiera risk för sjukskrivning längre än 90 dagar och inte är optimerade för att göra korrekta beräkningar när patienten varit sjukskriven 60 dagar eller längre.